

- L'INSTITUT PASTEUR DE BANGUI EST MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL DES INSTITUTS PASTEUR (RIIP) QUI REGROUPE 32 INSTITUTS ÉTABLIS DANS TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE.



ET PAR /

Le Laboratoire d'analyses médicales

- LE LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES EST OUVERT /

- du lundi au vendredi de 06h30 à 14h30
- le samedi de 07h00 à 11h00

- LE CENTRE DE VACCINATION EST OUVERT /

- du lundi au vendredi de 10h30 à 13h30



Conception graphique Philippe Sabin / sphi@wanadoo.fr

DIRECTEUR

- DR MIRDAD KAZANJI

ADRESSE

- INSTITUT PASTEUR DE BANGUI
- BP 923 - BANGUI
- REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
- TEL : 00 236 21 61 08 66 (sec.)
- FAX : 00 236 21 61 01 09
- INTERNET : www.pasteur-bangui.org
- E-MAIL : ipbangui@gmail.com



Institut Pasteur de Bangui

CENTRE DE VACCINATIONS



L'INSTITUT PASTEUR DE BANGUI EST UN ÉTABLISSEMENT RECONNU D'UTILITÉ PUBLIQUE, OBJET D'UNE CONVENTION ENTRE L'INSTITUT PASTEUR ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

LES **MISSIONS** DE L'INSTITUT PASTEUR DE BANGUI SONT :

- LA RECHERCHE BIOMÉDICALE
- L'APPUI À LA SANTÉ PUBLIQUE
- LES ACTIVITÉS DE SERVICE ET DE FORMATION

LES ACTIVITÉS DE SERVICE SONT ASSURÉES PAR /

Le Centre de Vaccination

Le centre de vaccination à l'Institut Pasteur de Bangui a été mis en place depuis la création de l'Institut en 1961 pour répondre aux besoins vaccinaux de la population centrafricaine surtout contre la **fièvre jaune**.

Aujourd'hui le centre de vaccination de l'Institut Pasteur de Bangui assure plus de **15 types de vaccins** ainsi que le **traitement antirabique**.



LES VACCINS DISPONIBLES AU CENTRE DE VACCINATION DE L'INSTITUT

PROTECTION CONTRE	NOM Composition	PROTOCOLES
<ul style="list-style-type: none"> • TÉTANOS (seul) 	TETAVAX® • Anatoxine tétanique purifiée	PLAIE • Vaccin datant de moins de 5 ans → <i>Revaccination inutile</i> . • Vaccin datant de + de 5 ans et - de 10 ans → <i>Rappel simple (1 dose)</i> . • Vaccin datant de + de 10 ans ou pas d'antécédent de vaccination → <i>Vaccin 1 dose - Globulines</i> . <i>Puis rappels vaccinaux à 1 mois et 6 mois.</i> GROSSESSE (Prévention du tétanos néonatal) • Pas d'antécédent de vaccination → <i>3 injections à 1 mois d'intervalle</i> . • Vaccin datant de plus de 5 ans et moins de 10 ans → <i>Rappel simple (1 dose)</i> .
<ul style="list-style-type: none"> • TÉTANOS (seul) 	TETANEA® • Fragments d'immunoglobulines équine antitétaniques	• En complément du vaccin, en cas de plaie, sur décision médicale → <i>1 ampoule (1500 UI) en intra-musculaire</i>
<ul style="list-style-type: none"> • TÉTANOS • DIPHTERIE • POLIOMYÉLITE • COQUELUCHE • Infections à HÆMOPHILUS INFLUENZÆ B 	PENTAXIM® • Anatoxine tétanique • Anatoxine diphtérique • Virus polio tué • Antigènes du bacille de la coqueluche • Antigènes de <i>Hæmophilus influenzae</i> type b	PRIMO-VACCINATION → <i>3 injections à 2 mois, 3 mois et 4 mois</i> • Rappels à l'âge de : → 16-18 mois → 6-7 ans → 11-13 ans → 16-18 ans → 26-28 ans → <i>Tous les 10 ans, ensuite chez l'adulte</i>

PROTECTION CONTRE	NOM Composition	PROTOCOLES
<ul style="list-style-type: none"> • TÉTANOS • DIPHTERIE • POLIOMYÉLITE • COQUELUCHE 	TETRAXIM® • Anatoxine tétanique • Anatoxine diphtérique • Virus polio tué • Antigènes du bacille de la coqueluche	• Selon le même schéma que PENTAXIM® → <i>Primo vaccination + rappels</i> OU • uniquement pour les rappels, après Primo vaccination par PENTAXIM®
<ul style="list-style-type: none"> • TÉTANOS • DIPHTERIE • POLIOMYÉLITE 	DULVANAX® • Anatoxine tétanique • Anatoxine diphtérique • Virus polio tué	• Selon le même schéma que PENTAXIM® → <i>Primo vaccination + rappels</i> OU • uniquement pour les rappels, après Primo vaccination par PENTAXIM®
<ul style="list-style-type: none"> • ROUGEOLE 	ROUVAX® • Morbillivirus vivant atténué	• Primo-vaccination à 9 mois.
<ul style="list-style-type: none"> • ROUGEOLE • OREILLONS • RUBÉOLE 	ROR® • Morbillivirus + virus des oreillons et de la rubéole, vivants atténués	• Enfants déjà vaccinés par ROUVAX® → <i>1 dose entre 12 et 24 mois</i> • Enfants "1 an non vaccinés par ROUVAX® et Adultes" de moins de 30 ans → <i>2 doses à 1 mois d'intervalle</i> • Femmes "30 ans non vaccinées" → <i>1 dose</i> • <i>S'assurer de l'absence de grossesse débutante, et éviter toute grossesse dans les 2 mois suivants la vaccination !</i>
<ul style="list-style-type: none"> • DÉTECTION D'UNE ALLERGIE À LA TUBERCULINE (il ne s'agit pas d'un vaccin) 	TUBERCULINE SSI® • Extrait protéique purifié du bacille tuberculeux	• Avant une vaccination BCG pour les enfants de + de 3 mois. • Aide au diagnostic de la tuberculose.
<ul style="list-style-type: none"> • TUBERCULOSE 	BCG SSI® • Bacille de Calmette et Guérin vivant et pourvoir pathogène atténué	• Vaccin réservé aux enfants. → <i>à la naissance (< 3 mois)</i> → <i>jusque 15 ans si risque élevé de tuberculose et IDR (-) en l'absence d'infection par le VIH.</i> <i>Le BCG, vaccin bactérien vivant, est contre-indiqué en cas de déficit immunitaire (VIH ou autre).</i>

PROTECTION CONTRE	NOM Composition	PROTOCOLES
<ul style="list-style-type: none"> • HÉPATITE B 	EUVAX® (adulte-enfant) • Particules de surface non infectantes du virus de l'hépatite B	→ <i>3 injections avec un intervalle d'au moins 1 mois entre la 1^{ère} et la 2^{ème} injection et un intervalle de 5 à 12 mois entre les 2^{ème} et 3^{ème} injections</i> • Chez l'adulte, contrôle sérologique préalable conseillé pour éviter de vacciner inutilement.
<ul style="list-style-type: none"> • HÉPATITE A 	AVAXIM® • Virus inactivé	→ <i>1 injection + 1 rappel 6 à 12 mois plus tard</i>
<ul style="list-style-type: none"> • FIÈVRE JAUNE 	STAMARIL® • Virus vivant atténué	→ <i>1 injection + 1 rappel tous les 10 ans</i> • Contre-indication chez la femme enceinte ou allaitante et l'enfant de moins de 9 mois. • Délivrance d'un Carnet International exigible aux contrôles aux frontières.
<ul style="list-style-type: none"> • FIÈVRE TYPHOÏDE 	TYPHIM VI® • Polyosides de <i>Salmonella typhi</i>	→ <i>1 seule injection + revaccination tous les 3 ans</i> • Adulte et enfant de plus de 2 ans.
<ul style="list-style-type: none"> • MÉNINGITES BACTÉRIENNES À MÉNINGOCOQUES A ET C 	ANTI MENINGOCOCCIQUE A · C® • Polyosides des méningocoques groupes A & C	→ <i>1 seule injection + revaccination tous les 3 ans</i> • Adulte et enfant de plus de 18 mois.
<ul style="list-style-type: none"> • MÉNINGITES BACTÉRIENNES À MÉNINGOCOQUES A, C, Y, W135 	MENOMUNE® • Polyosides des méningocoques des groupes A, C, Y, W135	• Des souches du groupe W135 ont été observées à plusieurs reprises en RCA depuis 2008. → <i>1 seule injection + revaccination tous les 3 ans</i> • Adulte et enfant de plus de 2 ans.
<ul style="list-style-type: none"> • RAGE 	VERORAB® • Virus inactivé	• En cas d'exposition (morsure/ griffade par un animal suspect) : L'indication est portée par le médecin qui prend en compte l'état de l'animal, les antécédents du patient, le siège et la gravité de la lésion. En l'absence d'antécédent vaccinal → <i>4 injections dont 2 à J-0, 1 à J-7 et 1 à J-21</i> Si nécessaire le traitement sera complété par une prophylaxie antitétanique et une antibiothérapie. • Vaccination à titre préventif (activités à risque comportant des contacts avec les animaux potentiellement vecteurs et/ou les virus eux-mêmes (personnel de laboratoire) : → <i>Primo-vaccination en 3 injections à J-0, J-7 et J-21 ou J-28</i> Rappels à 1 an puis tous les 5 ans.